

Domaine : **Élèves**

En vigueur le :

17 juin 2019 (CF)

Référence : [ÉLV 5.7 Administration de la Naloxone par voie nasale](#)

Révisée le :

31 août 2020 (CF)

*L'usage du masculin a pour but d'alléger le texte.*

## LES CINQ (5) ÉTAPES POUR RÉAGIR À UNE SURDOSE D'OPIOÏDES

# LES 5 ÉTAPES POUR RÉAGIR À UNE SURDOSE D'OPIOÏDES


ÉTAPE <b>1</b>		<b>CRIEZ &amp; SECOUEZ</b> le nom de la personne. & la personne par les épaules.
ÉTAPE <b>2</b>		<b>APPELEZ LE 9-1-1</b> si la personne ne réagit pas.
ÉTAPE <b>3</b>		<b>ADMINISTREZ DE LA NALOXONE</b> Vaporisez 1 fois dans une narine ou injectez 1 ampoule dans un bras ou dans une jambe.
ÉTAPE <b>4</b>		<b>FAITES DE LA RESPIRATION DE SAUVETAGE ET/OU DES COMPRESSIONS THORACIQUES.</b>
ÉTAPE <b>5</b>		<b>EST-CE QUE ÇA MARCHE?</b> S'il n'y a <b>pas</b> d'amélioration dans les 2-3 minutes, répétez les étapes 3 & 4. <b>Restez avec la personne.</b>

**POSITION DE RÉCUPÉRATION** Si la personne respire toute seule ou si vous devez la laisser seule, placez-la dans la position de récupération.

Tête légèrement penchée vers l'arrière pour ouvrir les voies respiratoires

Soutenir la tête avec la main

La position du genou empêche de rouler sur le ventre



### SYMPTÔMES DE SURDOSE D'OPIOÏDES

- on ne peut pas réveiller la personne
- respiration lente ou suspendue
- ronflements ou gargouillis
- lèvres et ongles bleus ou violets
- pupilles contractées ou yeux réversés
- corps flasque